

先天性風しん症候群発生届

都道府県知事（保健所設置市長・特別区長） 殿

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第12条第1項（同条第6項において準用する場合を含む。）の規定により、以下のとおり届け出る。

報告年月日 平成 年 月 日

医師の氏名 \_\_\_\_\_ 印 \_\_\_\_\_  
 (署名又は記名押印のこと)

従事する病院・診療所の名称 \_\_\_\_\_

上記病院・診療所の所在地(※) \_\_\_\_\_

電話番号(※) ( \_\_\_\_\_ ) \_\_\_\_\_

(※病院・診療所に従事していない医師にあっては、その住所・電話番号を記載)

1 診断（検案）した者（死体）の種類
・患者（確定例） ・感染症死亡者の死体

2 性別	3 診断時の年齢（0歳は月齢）
男 ・ 女	歳（      か月）

病 型	1 1 感染原因・感染経路・感染地域
1) CRS 典型例、 2) その他 4 症 状 ・白内障                      ・先天性緑内障 ・先天性心疾患（                      ） ・難聴 ・色素性網膜症              ・紫斑 ・脾腫                          ・小頭症 ・精神発達遅滞              ・髄膜炎 ・X線透過性の骨病変 ・黄疸（生後24時間以内に出現） ・その他（                      ）	①感染原因・感染経路 1 母親の妊娠中の風しん罹患歴 ・あり（発症した妊娠週数              週） ・なし ・不明 ②母親の感染地域（ 確定・推定 ） 1 日本国内（              都道府県              市区町村） 2 国外（              国                      ） ③出生時の母親の年齢（              歳）
5 診 断 方 法 ・分離・同定による病原体の検出 検体：咽頭拭い液・唾液・尿・その他 （                      ） ・検体から直接のPCR法による病原体遺伝子の検出 検体：咽頭拭い液・唾液・尿・その他 （                      ） ・血清IgM抗体の検出 ・血清赤血球凝集抑制(HI)抗体価が、移行抗体の推移から 予想される値を高く超えて持続（出生児のHI抗体価が、 月あたり1/2の低下率で低下していない） ・その他検査方法（                      ） 検体（                      ） 結果（                      ）	④母親の風しん含有ワクチン接種歴 1 回目 有（              歳）・ 無 ・ 不明 母子手帳等の記録による確認の有無（有・無） ワクチンの種類（風しん単抗原・MR・MMR・不明） 接種年月日（S・H 年 月 日 ・不明） 製造会社/Lot番号（              /              ・不明） 2 回目 有（              歳）・ 無 ・ 不明 母子手帳等の記録による確認の有無（有・無） ワクチンの種類（風しん単抗原・MR・MMR・不明） 接種年月日（S・H 年 月 日 ・不明） 製造会社/Lot番号（              /              ・不明）
6 初診年月日                      平成 年 月 日	
7 診断（検案(※)）年月日      平成 年 月 日	
8 感染したと推定される年月日 平成 年 月 日	
9 発病年月日（*）              平成 年 月 日	
10 死亡年月日（※）              平成 年 月 日	

(1, 2, 4, 5, 11 欄は該当する番号等を○で囲み、3, 6 から 10 欄は年齢、年月日を記入すること。

(※) 欄は、死亡者を検案した場合のみ記入すること。

(\*) 欄は、患者（確定例）を診断した場合のみ記入すること。

4, 5 欄は、該当するものすべてを記載すること。

この届出は診断から7日以内に行ってください