

(9) フリージア
ア 殺菌剤, イ 土壌消毒剤

農 薬 名	成 分 名	系 統 名	RAC コード I:殺虫 F:殺菌	適 用 病 害 虫 名										注 意 事 項
				球 根 腐 敗 病 F	菌 核 病	立 枯 病	首 腐 病							
〈 殺 菌 剤 〉														
オーソサイド水和剤 80	キャブタン	その他	I:M04				花						花:【花き類・観葉植物登録】	
トップジン M 水和剤	チオファネートメチル	ベンゾイミダゾール	I:1		花								花:【花き類・観葉植物登録】	
ホーマイ水和剤	チウラム・チオファネートメチル	混合剤	I:M03・1	◎									30分間球根浸漬又は球根粉衣	
〈 土 壌 消 毒 剤 〉														
ガスタード微粒剤 バスアミド微粒剤	カゾメット		I:8F	花		花	花						花:【花き類・観葉植物登録】	
トラペックサイド油剤	メチルイソチシアネート		I:8F		花								花:【花き類・観葉植物登録】	
N C S	カーバム		I:8F			◎								

注) 球根腐敗病の対象病原菌の表記 F: *Fusarium*

ウ 病虫害防除法（フリージア）

（ア）球根腐敗病 *Fusarium oxysporum*

（防除のねらい）

汚染種球で伝染するが、発生地では被害植物残渣とともに土壤中に残存し、伝染源となる。球根消毒は必ず行い、発病のおそれのある場合は土壤消毒を行う。

（耕種的防除法）

- （１）連作を避ける。
- （２）病株は除去・焼却する。
- （３）無病種球を用いる。

（化学的防除法の注意事項）

消毒後は風乾して植え付ける。

（イ）首腐病 *Burkholderia gladioli* pv. *gladioli*

（防除のねらい）

グラジオラスの項参照

（ウ）白絹病 *Sclerotium rolfsii*

（耕種的防除法）

ユリの項参照

（エ）モザイク病 BYMV, CMV

（防除のねらい）

グラジオラスの項参照