

水 稲

ア) 移植水稲

| 除草剤名 | 成分名 | 移植時 (田植同時散布) | 適 用 雑 草 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--|-------------------------------|---|--|--------------------|----------|----------|---------------|--------------------|--------|-----------------------|----------------------------|------------------|------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------|---|---|
| | | | 一年生 | | キシ ユウスズ メノヒエ | ウリ カワ | オモ ダカ | ク ログ ワイ | コ ウキ ヤガ ラ | セ リ | ヒ ル ム シ ロ | ヘ ラ オ モ ダ カ | ホ タ ル イ | マ ツ バ イ | ミ ズ ガ ヤ ツ リ | 藻類 による 表層は く離 | ア オ ミ ド ロ | | |
| | | | イ ネ 科 | 非 イ ネ 科 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 初期 剤 | ノビエ1葉期まで メテオフロアブル | ベンチキサゾン | ○ | ○ | ○ | | | | ○ | | | | ○ | ○ | | | | | |
| 初・ 中期 一 発 剤 | ノビエ2葉期まで | イノーバDX1キロ粒剤51 | ダ [®] イムロン フェントラサ [®] ミト [®] プロモブ [®] チト [®] ベ [®] ンスルフロンメチル | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| | | カットダウン1キロ粒剤 | イマゾ [®] スルフロン ピ [®] ラクロニル | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| | | クラッシュE Xジャンボ | イマゾ [®] スルフロン カフェンストール ダ [®] イムロン | | ○ | ○ | | | | | ○ | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | | ミスターホームランLジャンボ | オキサジ [®] クロメホン クロム [®] ロップ [®] ベ [®] ンスルフロンメチル | | ○ | ○ | | | ○ | | ○ | ○ | | ○ | ○ | ○ | | | |
| | ノビエ2.5葉期 まで | イッポンD1キロ粒剤51 | ダ [®] イムロン ピ [®] ラクロニル プロモブ [®] チト [®] ベ [®] ンスルフロンメチル | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | | イネキング1キロ粒剤 | ピ [®] ラクロニル ピ [®] ラゾ [®] レート ベ [®] ンゾ [®] ピ [®] シクロン | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | | イノーバDXアップ1キロ粒剤51 | ダ [®] イムロン フェントラサ [®] ミト [®] プロモブ [®] チト [®] ベ [®] ンスルフロンメチル | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | | ジェイソウル1キロ粒剤 | シクロピ [®] リモレート ピ [®] ラゾ [®] レート フェントラサ [®] ミト [®] | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | | クサトリエースLジャンボ (早期はノビエ2葉期まで) | カフェンストール ダ [®] イムロン ベ [®] ンスルフロンメチル | | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | サラブレッドフロアブル | サラブレッドKAI11キロ粒剤 | イマゾ [®] スルフロン オキサジ [®] クロメホン ダ [®] イムロン | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | | サラブレッドKAI400FG | イマゾ [®] スルフロン オキサジ [®] クロメホン ピ [®] ラクロニル | | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | | ○ | ○ | ○ | | | | |
| | | サラブレッドKAIジャンボ | イマゾ [®] スルフロン オキサジ [®] クロメホン ピ [®] ラクロニル | | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | | ○ | ○ | ○ | | | | |
| | | バッチリ1キロ粒剤 | イマゾ [®] スルフロン ピ [®] ラクロニル プロモブ [®] チト [®] | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | | バッチリLX1キロ粒剤 | イマゾ [®] スルフロン オキサジ [®] クロメホン ピ [®] ラクロニル プロモブ [®] チト [®] | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | | ノビエ2.5葉期 まで | サラブレッドGOジャンボ | ピ [®] ラクロニル イマゾ [®] スルフロン オキサジ [®] クロメホン プロモブ [®] チト [®] | | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| サラブレッドGO400FG | ピ [®] ラクロニル イマゾ [®] スルフロン オキサジ [®] クロメホン プロモブ [®] チト [®] | | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | |
| ミスターホームラン1キロ粒剤51 | オキサジ [®] クロメホン クロム [®] ロップ [®] ベ [®] ンスルフロンメチル | | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | |

ア) 移植水稲

| 除草剤名 | 成分名 | 移植時 (田植同時散布) | 適用雑草 | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|-----------------------------|---|-------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------------------|--------|-----------------------|----------------------------|------------------|------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------|---|---|
| | | | 一年生 | | キシ ウ カ ワ | オ モ ダ カ | ク ロ グ ワ イ | コ ウ キ ヤ ガ ラ | セ リ | ヒ ル ム シ ロ | ヘ ラ オ モ ダ カ | ホ タ ル イ | マ ツ バ イ | ミ ズ ガ ヤ ツ リ | 藻類 による 表層は く離 | ア オ ミ ド ロ | | |
| | | | イ ネ 科 | 非 イ ネ 科 | | | | | | | | | | | | | | |
| ノビエ3葉期 まで | アップレZジャンボ | ビラクロニル プロピリスルフォン プロモブチト | | ○ | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | アップレZ400FG | ビラクロニル プロピリスルフォン プロモブチト | | ○ | ○ | | 多年生広葉雑草 | | | | | | | | | | ○ | ○ |
| | アピログロウMXジャンボ | ビラゾスルフォンエチル ピリフタリト プレチラクロール メソトリオン | | ○ | ○ | | ○ | ○ | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | イネリーグジャンボ | フェントラサミト テフリトリオン クロムブロップ | | ○ | ○ | | ○ | ○ | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | カイリキZジャンボ | イプフェンカルバゾン テフリトリオン プロピリスルフォン | | ○ | ○ | | 多年生広葉雑草 | | | | | | | | | | | |
| | デオーレ1キロ粒剤 | オキサジクロモホン テフリトリオン メタゾスルフォン | ○ | ○ | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | ドリフ1キロ粒剤 | トリアフェモン フェントラサミト クロムブロップ エトキシスルフォン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | マスラオ1キロ粒剤 | イマゾスルフォン ピリミノハックメチル フェンキトリオン | ○ | ○ | ○ | | 多年生広葉雑草 | | | | | | | | | | ○ | ○ |
| | エンペラー1キロ粒剤 | ビラクロニル ピリミノハックメチル フェンキトリオン | ○ | ○ | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | エンペラージャンボ | ビラクロニル ピリミノハックメチル フェンキトリオン | | ○ | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | エンペラー豆つぶ250 | ビラクロニル ピリミノハックメチル フェンキトリオン | | ○ | ○ | | 多年生広葉雑草 | | | | | | | | | | ○ | ○ |
| | キマリテ1キロ粒剤 | イプフェンカルバゾン テフリトリオン | ○ | ○ | ○ | | ○ | ○ | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | キマリテジャンボ | イプフェンカルバゾン テフリトリオン | | ○ | ○ | | ○ | ○ | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | 銀河1キロ粒剤 | ダイムロン ビラクロニル メタゾスルフォン | ○ | ○ | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | ザークD1キロ粒剤51 | ダイムロン ヘンスルフォンメチル メフェナセット | | ○ | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | ジェイフレンドジャンボ | オキサジクロモホン テフリトリオン ビラクロニル | | ○ | ○ | | ○ | ○ | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | シグナスジャンボ | テフリトリオン フェントラサミト メタゾスルフォン | | ○ | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ビクトリーZジャンボ | ビラクロニル プロピリスルフォン | | ○ | ○ | | 多年生広葉雑草 | | | | | | | | | | ○ | ○ | |
| 移植3日～ ノビエ3.0葉期 まで | デオーレジャンボ | メタゾスルフォン オキサジクロモホン テフリトリオン | | ○ | ○ | | 多年生広葉雑草 | | | | | | | | | | | |
| 移植直後～ ノビエ3.5葉期 まで | カウンスルエナジージャンボ/ アバンティジャンボ | トリアフェモン フェンキトリオン フェントラサミト | | ○ | ○ | | 多年生雑草 | | | | | | | | | | | |

ア) 移植水稻

| 除草剤名 | | 成分名 | 移植時 (田植同時散布) | 適用雑草 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|--|---|-------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------------------|--------|-----------------------|----------------------------|------------------|------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------|---|--|---|---|---|---|
| | | | | 一年生 | | キシ ウ カ ワ | オ モ ダ カ | ク ロ グ ワ イ | コ ウ キ ヤ ガ ラ | セ リ | ヒ ル ム シ ロ | ヘ ラ オ モ ダ カ | ホ タ ル イ | マ ツ バ イ | ミ ズ ガ ヤ ツ リ | 藻類 による 表層は く離 | ア オ ミ ド ロ | | | | | | |
| | | | | イ ネ 科 | 非 イ ネ 科 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 初・ 中期 一発 剤 | カウンスルエナジー1キロ粒剤/ アバンティ1キロ粒剤 | トリアフェモン フェンキナトリオン フェントラサ [®] ミト [®] | ○ | ○ | ○ | 多年生雑草 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | カウンスルエナジーフロアブル/ アバンティフロアブル | トリアフェモン フェンキナトリオン フェントラサ [®] ミト [®] | ○ | ○ | ○ | 多年生雑草 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | カウンスルコンプリート1キロ粒剤/ ポデーガードプロ1キロ粒剤 | テフリルトリオン トリアフェモン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | |
| | ジャスタ1キロ粒剤/ クサウェポン1キロ粒剤 | シクロピ [®] リモレート トリアフェモン ピ [®] ラゾ [®] レート | ○ | ○ | ○ | 多年生雑草 | | | | | | | | | | | | | | ○ | ○ | | |
| | ジャスタフロアブル/ クサウェポンフロアブル | シクロピ [®] リモレート トリアフェモン ピ [®] ラゾ [®] レート | ○ | ○ | ○ | 多年生雑草 | | | | | | | | | | | | | | ○ | ○ | | |
| | プライオリティ豆つぶ250 | トリアフェモン フェンキナトリオン | | ○ | ○ | 多年生雑草 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | プライオリティジャンボ | トリアフェモン フェンキナトリオン | | ○ | ○ | 多年生雑草 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 移植後3日～ ノビエ3.5葉期 まで | ゼータプラスジャンボ | フェンキナトリオン プロピ [®] リスルフロ [®] ン | | ○ | ○ | 多年生広葉雑草 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 移植直後～ ノビエ4葉期 まで | アシュラジャンボ | トリアフェモン ピ [®] ラクロ [®] ル ベンゾ [®] ピ [®] シクロ [®] ン | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | |
| | | アシュラ400FG | トリアフェモン ピ [®] ラクロ [®] ル ベンゾ [®] ピ [®] シクロ [®] ン | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | |
| アシュラ1キロ粒剤 | | トリアフェモン ピ [®] ラクロ [®] ル ベンゾ [®] ピ [®] シクロ [®] ン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | |
| アシュラフロアブル | | トリアフェモン ピ [®] ラクロ [®] ル ベンゾ [®] ピ [®] シクロ [®] ン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | |
| 移植後7日～ ノビエ4葉期 まで | アクシズMX1キロ粒剤 | ピ [®] リフタリト [®] メソトリオン メタゾ [®] スルフロ [®] ン | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | |
| 移植後7日～ノビエ 4葉期まで 但し、収穫60日前 まで | ウィードコア1キロ粒剤 | フロルピ [®] ラキエンベンゾ [®] ル ベ [®] キススラム ベンゾ [®] ピ [®] シクロ [®] ン | | ○ | ○ | ○ | 多年生広葉雑草 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 中・ 後期 剤 | 移植後15日～ ノビエ3.5葉期 但し、収穫60日前 まで | ハイカット1キロ粒剤 | シハロホッフ [®] フ [®] チル ジ [®] メタメリン ハロスルフロ [®] ンメチル ベンゾ [®] ピ [®] シクロ [®] ン | | ○ | ○ | ○ | 多年生広葉雑草 | | | | | | | | | | | | | | ○ | ○ |
| | 移植後7日～ ノビエ4葉期 但し、収穫30日前 まで | クリンチャー1キロ粒剤 | シハロホッフ [®] フ [®] チル | ノ・ア | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 移植後14日～ ノビエ4葉期 但し、収穫60日前 まで | レプラスジャンボ | ジ [®] メタメリン ダ [®] イムロン テフリルトリオン メタゾ [®] スルフロ [®] ン | | ○ | ○ | 多年生広葉雑草 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 移植後15日～ ノビエ4葉期 但し、収穫45日前 まで | ワイドショット1キロ粒剤 | テフリルトリオン ベ [®] キススラム | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | |
| | 移植後14日～ ノビエ5葉期 但し、収穫50日前 まで | トドメMF1キロ粒剤 | タミホッフ [®] | ノ・ア | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

イ) 直播水稲

| 除草剤名 | 成分名 | は種時 (同時散布) | 適用雑草 | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------------|--|-------------|------------------|-------------------------|----------|----------|---------------|--------------------|--------|-----------------------|----------------------------|------------------|------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------|--|
| | | | 一年生 | | キシ ユウスズ ズメノヒ エ | ウリ カワ | オモ ダカ | ク ログ ワイ | コ ウキ ヤガ ラ | セ リ | ヒ ル ム シ ロ | ヘ ラ オ モ ダ カ | ホ タ ル イ | マ ツ バ イ | ミ ズ ガ ヤ ツ リ | 藻類 による 表層は く離 | ア オ ミ ド ロ | |
| | | | イ ネ 科 | 非 イ ネ 科 | | | | | | | | | | | | | | |
| は種時, は種直後～ヒ ^エ 1.5葉期まで 但し, 収穫90日 前まで | サンバード粒剤 | ピラゾレート | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | | ○ | ○ | ○ | | | |
| 稲1葉期～ ヒ ^エ 2.5葉期 但し, 収穫90日 前まで | ザークD1キロ粒剤51 | カ ^イ ムロン ペンシルフロメチル メフェナセツ | | ○ | ○ | | | | | | | | | | ○ | | | |
| は種後10日～ ヒ ^エ 3葉期, 但し, 収穫30日 前まで | クリンチャー1キロ粒剤 | シハロップ ^フ チル | | ノ | | | | | | | | | | | | | | |
| は種後25日～ ヒ ^エ 4葉期 但し, 収穫30日 前まで | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| は種時 | ヒエクリーン1キロ粒剤 | ピリミバ ^ク メチル | ○ | ノ | | | | | | | | | | | | | | |
| は種直後～稲出 芽前 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 稲3葉期～ヒ ^エ 4 葉期 但し, 収 穫45日前まで | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 稲1葉期～ ヒ ^エ 4葉期 但し, 収穫45日 前まで | フルチャー ^ジ ジャンボ | カルフェントラ ^ソ ンエチル フルセトスルフロ ^ン | | ○ | ○ | | ○ | | | | | ○ | ○ | | ○ | ○ | | |
| 播種後10日～ ノビ ^エ 5葉期 但し, 収穫50日 前まで | クリンチャーバスME液剤 | シハロップ ^フ チル ペンタゾ ^ソ ナトリウム塩 | | ○ | ○ | | ○ | | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | | |
| 播種後10日～ ノビ ^エ 5葉期 但し, 収穫30日 前まで | クリンチャーEW | シハロップ ^フ チル | | ○ | | | | | | | | | | | | | | |
| 播種後35日～50日 但し, 収穫50日 前まで | バサグラン液剤(ナトリウム塩) | ペンタゾ ^ソ ナトリウム塩 | | | ○ | | ○ | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | | |

1. ノはノビエのみの登録。