

## 果樹類

| 農薬の名称   | 成分                          | 適用雑草名                            | 使用時期  | 使用方法   |
|---|-----------------------------|----------------------------------|---|--------|
| 草枯らしM I C   | グリホサートイソプロピルアミン塩            | 一年生雑草<br>多年生雑草                   | 収穫7日前まで<br>雑草生育期<br>(かんきつ、パイナップルを除く)                                      | 雑草茎葉散布 |
| ザクサ液剤   | グリホシネートPナトリウム塩              | 一年生雑草<br>多年生雑草                   | 収穫前日まで<br>雑草生育期<br>(かんきつ、りんご、びわ、いちじょう(種子)、くり、キウフルーツ、食用桑(果実)、さんしょう(果実)を除く) | 雑草茎葉散布 |
| サンダーボルト007  | グリホサートイソプロピルアミン塩・ピラフルフェンエチル | 一年生雑草<br>多年生雑草                   | 収穫7日前まで<br>雑草生育期：草丈30cm以下<br>(かんきつ、キウフルーツ、パイナップルを除く)                      | 雑草茎葉散布 |
| タッチダウンi Q   | グリホサートカリウム塩                 | 一年生雑草<br>多年生雑草<br>スギナ            | 収穫5日前まで<br>雑草生育期：草丈30cm以下(スギナを除く)<br>(かんきつを除く)                            | 雑草茎葉散布 |
| プリグロックスL  | ジクワット・パラコート                 | 一年生雑草<br>多年生雑草<br>スギナ            | 雑草生育期<br>但し、収穫前日まで<br>(かんきつを除く)   | 雑草茎葉散布 |
| ラウンドアップマックスロード  | グリホサートカリウム塩                 | 一年生雑草<br>多年生雑草<br>スギナ<br>マルバツユクサ | 収穫7日前まで<br>雑草生育期<br>(かんきつを除く)   | 雑草茎葉散布 |
| レグロックス  | ジクワット                       | 果樹園下草一年生雑草                       | 雑草生育期<br>但し、収穫30日前まで  | 雑草茎葉散布 |
| <p>(除草剤使用上の注意点)</p> <p>(1)プリグロックスL、レグロックスは、非イオン系展着剤を加用する。</p> <p>(2)草枯らしM I C、タッチダウンi Q、ラウンドアップマックスロードの少量散布には専用ノズルを使用する。</p> <p>※1 グリホサートイソプロピルアミン塩、グリホサートカリウム塩、(グリホサートアンモニウム塩)は、全てグリホサート剤として同一剤とみなし、使用に際しては、有効成分の総使用回数を超えないように確認すること。</p> <p>※2 グリホシネート、グリホシネートPナトリウム塩は同一剤とみなし、使用に際しては、有効成分の総使用回数を超えないように確認すること。</p> |                             |                                  |   |        |

## カンキツ

| 農薬の名称   | 成分                          | 適用雑草名                            | 使用時期                              | 使用方法           |
|---|-----------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|----------------|
| 草枯らしM I C   | グリホサートイソプロピルアミン塩            | 一年生雑草<br>多年生雑草                   | 収穫7日前まで<br>雑草生育期                  | 雑草茎葉散布         |
| ザクサ液剤   | グリホシネートPナトリウム塩              | 一年生雑草<br>多年生雑草                   | 収穫21日前まで<br>雑草生育期                 | 雑草茎葉散布         |
| サンダーボルト007  | グリホサートイソプロピルアミン塩・ピラフルフェンエチル | 一年生雑草<br>多年生雑草                   | 収穫7日前まで<br>雑草生育期：草丈30cm以下         | 雑草茎葉散布         |
| ゾーバー  | ターバシル・DCMU                  | 一年生雑草                            | 雑草発芽前及び雑草生育期<br>但し、収穫60日前まで       | 土壌全面散布及び雑草茎葉散布 |
| タッチダウンi Q   | グリホサートカリウム塩                 | 一年生雑草<br>多年生雑草<br>スギナ            | 収穫5日前まで<br>雑草生育期：草丈30cm以下(スギナを除く) | 雑草茎葉散布         |
| バスタ液剤   | グリホシネート                     | 一年生雑草<br>多年生雑草                   | 収穫21日前まで<br>雑草生育期：草丈30cm以下        | 雑草茎葉散布         |
| プリグロックスL  | ジクワット・パラコート                 | 一年生雑草<br>多年生雑草<br>スギナ<br>ツユクサ    | 雑草生育期<br>但し、収穫前日まで                | 雑草茎葉散布         |
| ラウンドアップマックスロード  | グリホサートカリウム塩                 | 一年生雑草<br>多年生雑草<br>スギナ<br>マルバツユクサ | 収穫7日前まで<br>雑草生育期                  | 雑草茎葉散布         |
| <p>(除草剤使用上の注意点)</p> <p>(1)プリグロックスL、ゾーバーは、非イオン系展着剤を加用する。</p> <p>(2)草枯らしM I C、タッチダウンi Q、ラウンドアップマックスロードの少量散布には専用ノズルを使用する。</p> <p>※1 グリホサートイソプロピルアミン塩、グリホサートカリウム塩、(グリホサートアンモニウム塩)は、全てグリホサート剤として同一剤とみなし、使用に際しては、有効成分の総使用回数を超えないように確認すること。</p> <p>※2 グリホシネート、グリホシネートPナトリウム塩は同一剤とみなし、使用に際しては、有効成分の総使用回数を超えないように確認すること。</p> |                             |                                  |                                   |                |

## 温州みかん

| 農薬の名称 | 成分    | 適用雑草名          | 使用時期                               | 使用方法           |
|-------|-------|----------------|------------------------------------|----------------|
| ハイバーX | プロマシル | 一年生雑草<br>多年生雑草 | 雑草発芽前又は雑草生育期(梅雨明け期)<br>但し、収穫60日前まで | 雑草茎葉散布又は全面土壌散布 |

## ビワ

| 農薬の名称   | 成分             | 適用雑草名          | 使用時期                       | 使用方法   |
|---|----------------|----------------|----------------------------|--------|
| ザクサ液剤   | グリホシネートPナトリウム塩 | 一年生雑草<br>多年生雑草 | 収穫21日前まで<br>雑草生育期          | 雑草茎葉散布 |
| バスタ液剤   | グリホシネート        | 一年生雑草<br>多年生雑草 | 収穫21日前まで<br>雑草生育期：草丈30cm以下 | 雑草茎葉散布 |
| (除草剤使用上の注意点)<br>※ グリホシネート, グリホシネートPナトリウム塩は同一剤とみなし, 使用に際しては, 有効成分の総使用回数を超えないように確認すること。 |                |                |                            |        |

## ブドウ

| 農薬の名称 | 成分      | 適用雑草名          | 使用時期                     | 使用方法   |
|-------|---------|----------------|--------------------------|--------|
| バスタ液剤 | グリホシネート | 一年生雑草<br>多年生雑草 | 収穫前日まで<br>雑草生育期：草丈30cm以下 | 雑草茎葉散布 |

## ナシ

| 農薬の名称 | 成分      | 適用雑草名          | 使用時期                     | 使用方法   |
|-------|---------|----------------|--------------------------|--------|
| バスタ液剤 | グリホシネート | 一年生雑草<br>多年生雑草 | 収穫前日まで<br>雑草生育期：草丈30cm以下 | 雑草茎葉散布 |

## カキ

| 農薬の名称 | 成分      | 適用雑草名          | 使用時期                     | 使用方法   |
|-------|---------|----------------|--------------------------|--------|
| バスタ液剤 | グリホシネート | 一年生雑草<br>多年生雑草 | 収穫前日まで<br>雑草生育期：草丈30cm以下 | 雑草茎葉散布 |

## ウメ

| 農薬の名称                | 成分      | 適用雑草名          | 使用時期                     | 使用方法   |
|----------------------|---------|----------------|--------------------------|--------|
| バスタ液剤<br>(注1)        | グリホシネート | 一年生雑草<br>多年生雑草 | 収穫前日まで<br>雑草生育期：草丈30cm以下 | 雑草茎葉散布 |
| (注1) 適応樹種は, 小粒核果類である |         |                |                          |        |