

飼料用とうもろこし

農薬の名称	成分	適用雑草名	使用時期	使用方法
アルファード液剤	トプラメゾン	一年生雑草	とうもろこし3～5葉期 但し、収穫45日前まで とうもろこし6～7葉期 但し、収穫45日前まで	雑草茎葉散布又は全面散布
エコトップ乳剤 (注1)	ジメチアミド・リニuron	一年生雑草	は種後出芽前(雑草発生前)	全面土壌散布
ゲザノンゴールド	アトラジン・S-メトラコロール	一年生雑草	マルチ前、は種前(雑草発生前)、 は種後発芽前(雑草発生前)、 生育期(とうもろこし2～4葉期)	全面土壌散布
ゲザプリムフロアブル (注2)	アトラジン	一年生雑草	は種後～とうもろこし2～4葉期まで	全面土壌散布及び 雑草茎葉散布
シャドー水和剤	ハロスフロンメチル	キクイモ 一年生及び多年 生広葉雑草	とうもろこし5葉期(キクイモ生育期) とうもろこし3～5葉期(一年生及び 多年生広葉雑草2～5葉期)	雑草茎葉散布又は全面散布
デュアールゴールド	S-メトラコロール	一年生イネ科雑草 一年生雑草	本葉1～2葉期(イネ科雑草2葉期まで) は種後出芽前(雑草発生前)	全面土壌散布
バサグラン液剤(ナトリウム塩)	ベンザンナトリウム塩	一年生雑草(イ ネ科を除く)	生育期(雑草の3～6葉期) 但し、収穫50日前まで	雑草茎葉散布又は全面散布
ブルーシアフロアブル	トルビラレート	一年生雑草	とうもろこし3～5葉期 但し収穫 45日前まで	雑草茎葉散布又は全面散布
モーティブ乳剤 (注3)	ジメチアミド・P・ベンデイメタリン	一年生雑草	は種後～とうもろこし2葉期 (イネ科雑草2葉期まで)	全面土壌散布
ラウンドアップマックスロード	グリホサートカリウム塩	一年生及び多年 生雑草	飼料用とうもろこし出芽前まで (雑草生育期)	雑草茎葉散布
ラッソー乳剤 (注4)	アトラコロール	一年生雑草 一年生イネ科雑草	は種後出芽前 生育期1～2葉期 (イネ科雑草2葉期まで)	全面土壌散布 雑草茎葉散布又は 全面土壌散布
ワンホープ乳剤 (注5)	ニコスルフロン	一年生雑草及び 多年生イネ科雑草	とうもろこし3～5葉期 但し、収穫30日前まで	雑草茎葉散布又は全面散布
(注意事項) (注1) 砕土、整地は丁寧にいき覆土深は2～3cm 以上とする。適用土壌は砂土を除く全土壌。 (注2) 適用土壌は砂土を除く全土壌。 (注3) 適用土壌は砂土を除く全土壌。 (注4) ラッソー乳剤とゲザプリムフロアブルの混用はイネ科・広葉雑草が共に多い場合に使用し、薬液混合は散布当日に行う。 (注5) 高温(気温 30℃以上)、乾燥条件では使用しない。適用品種があるので、適用品種以外には使用しない。				

飼料用さとうきび

農薬の名称	成分	適用雑草名	使用時期	使用方法
アージラン液剤	アシュラム	一年生及び多年 生雑草	雑草生育期 但し、収穫30日前まで	雑草茎葉散布又は全面散布
カーメックス顆粒水和剤	DCMU	一年生雑草	【株出】 萌芽前(雑草発生前)	全面土壌散布
		一年生及び多年 生広葉雑草	【株出】 雑草生育期 但し、収穫90日前まで	雑草茎葉散布
		一年生雑草	【春植又は夏植】 植付覆土後(雑草発生前)	全面土壌散布
		一年生及び多年 生広葉雑草	【春植又は夏植】 雑草生育期 但し、収穫90日前まで	雑草茎葉散布
センコル水和剤	メトリアジン	一年生雑草, ムラサキカタバミ	【株出】 萌芽45日後まで(雑草2葉期まで)	全面土壌散布 雑草茎葉散布
			【春植又は夏植】 植付直後～植付45日後まで (雑草2葉期まで)	全面土壌散布 雑草茎葉散布

飼料用さとうきび（つづき）

農薬の名称	成分	適用雑草名	使用時期	使用方法
ダイロンゾル	DCMU	一年生雑草及び多年生広葉雑草	【株出】 萌芽前（雑草発生前）	土壌散布
			【株出】 萌芽前（雑草発生前）、 生育期（雑草生育期） 但し、収穫75日前まで	雑草茎葉散布又は 全面土壌散布
			【春植又は夏植】 植付後萌芽前（雑草発生前）	土壌散布
			【春植又は夏植】 植付後萌芽前（雑草発生前）、 生育期（雑草生育期） 但し、収穫75日前まで	雑草茎葉散布又は 全面土壌散布
ラウンドアップマックスロード	グリホサートカリウム塩	一年生雑草及び多年生雑草	耕起前又は植付前まで （雑草生育期）	雑草茎葉散布
2, 4-Dアミン塩	2, 4-PAジメチルアミン	一年生及び多年生広葉雑草	植付後又は株出管理後30日以降雑草 生育期（草丈30cm以下） 但し、収穫90日前まで	雑草茎葉散布

ソルガム

農薬の名称	成分	適用雑草名	使用時期	使用方法
ゲザノンゴールド	アトラジン・S-メトラコロール	一年生雑草	は種直後	全面土壌散布
ゲザプリムフロアブル （注1）	アトラジン	一年生広葉雑草	は種後（雑草発生前～始期）	全面土壌散布及び雑草 茎葉散布
（注意事項） （注1）適用土壌は砂土を除く全土壌。				

牧草

農薬の名称	成分	適用雑草名	使用時期	使用方法
アージラン液剤 （注1）	アシェラム	ギンギン類及び キク科の雑草	秋～春期（9～5月） ギンギン類の展葉時期 但し、採草14日前まで	雑草茎葉散布又は全 面散布
		ワラビ	早春～秋期（1～11月） ギンギン類の展葉時期	雑草茎葉散布 （局所処理）
ハーモニー75DF水和剤 （注2）	チフェンスルフロンメチル	ギンギン類、 一年生広葉雑草	雑草生育期 但し、採草21日前まで	雑草茎葉散布又は全 面散布
		ギンギン類	新播草地定着後 （但し、ギンギン類草丈20cm以下） 但し、採草21日前まで	
バンベルーD液剤	MDBAジメチルアミン	ギンギン	秋期最終刈取後30日以内	雑草茎葉散布
ラウンドアップマックスロード （注3）	グリホサートカリウム塩	一年生及び多年生雑草	耕起前まで（雑草生育期）、 耕起整地後～は種当日まで （雑草発生前期）	雑草茎葉散布
（注意事項） （注1）夏期の散布は薬害が生じることがあるので避ける。 （注2）クローバーには薬害がある。 （注3）非選択性の除草剤である。				