

# 虫害によるさつまいもの腐敗に注意！



- 令和4, 5年産ともに、一部のほ場でさつまいもの収穫後半(10月以降)に、基腐病以外の腐敗の発生が見られています。
- 腐敗の要因は、いもが**害虫**(コガネムシ, ハリガネムシ, センチュウ等)等の**被害**を受け、その傷から細菌が感染したものです。

これまでの**基腐病対策に加え、害虫対策もしっかり行う**ことが重要です。

## <虫害による傷>

これらの虫害の傷から細菌等が感染



幼虫



ネコブセンチュウによる被害



ハリガネムシ



コガネムシによる被害

ハリガネムシによる被害

## <いもの腐敗の状況>



虫害の傷から細菌等が感染し、腐敗したいも。

## <害虫対策のさつまいも適用農薬一覧>

害虫	農薬名	10a使用量	使用時期	使用方法	使用回数
ネコブセンチュウ ネグサレセンチュウ	ネマクリーン粒剤	20kg	植付前	全面土壌混和	1回
	ビーラム粒剤	20kg	植付前	全面土壌混和	1回
	ネマトリンエース粒剤	20~30kg	植付前	全面土壌混和	1回
コガネムシ類	ダントツ粒剤	6~9kg	植付前	全面処理土壌混和又は 作条処理土壌混和	1回
コガネムシ類 ハリガネムシ類	プリンスベイト	6kg	植付前又は 植付時	全面処理土壌混和又は 植溝処理土壌混和	1回
	ダズバン粒剤	9kg	植付時	全面土壌混和又は 植溝土壌混和	2回以内

※適用農薬の一部を記載しています。

防除については、お近くの県地域振興局・支庁農政普及課にお問い合わせください。