

早期水稻病害虫発生予察巡回調査月報（4月）

生育 状況	田植直後～活着期
生育 概況	平年並

調査年月日：2024年 4月11～18日

病害虫名	総合概評	概評	地域	発生面積 (ha)	発生ほ場率(%)		程度別発生ほ場率(%)										特記事項								
					本年	平年	甚	多	中	少	無	14	15	16	17	18		19	20	21	22	23			
〇いもち病	並	並	薩摩	0	0	0					100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			大隅	0	0	0					100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
			熊毛	0	0	0					100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
			県計	0	0	0					100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
イネミズザケムシ	並	並	薩摩	523	36	30			14	21	64	50	64	50	14	43	7	29	36	7	0	吹上：中2, 日吉：少2, 金峰：少1 有明：少1 中種子：少2, 南種子：少2			
			大隅	150	8	37				8	92	64	64	43	50	71	21	14	14	14	14		14		
			熊毛	670	100	53					100		100	75	50	100	25	75	100	0	0		0	0	
			県計	1,343	34	37			5	29	66	66	66	47	47	53	26	35	19	9	7		7		
イネザケムシ	並	並	薩摩	209	14	9			7	7	86	29	36	0	14	14	0	0	0	0	0	吹上：中1, 少1, 南種子：多1, 少1			
			大隅	0	0	10					100	0	21	0	50	21	0	0	0	0	0		7		
			熊毛	335	50	48	25		25	50	100	0	25	100	50	0	100	100	0	0	0		0		
			県計	544	14	17	4	3	7	86	28	22	5	47	24	0	18	18	0	3	3				
スミリンゴガイ	やや多	やや多	薩摩	628	43	31			21	21	57	21	43	14	29	36	21	36	36	29	50	大浦：中1, 加世田：中1, 少1, 日吉：少1, 吹上：中1, 少1, 大崎：中2, 高山：少1, 吾平：少1			
			大隅	598	33	22			17	17	67	21	21	14	21	14	14	21	7	43	43				
			熊毛	0	0	8					100	0	0	25	50	0	0	0	0	0	0		0		
			県計	1,226	31	23			16	16	69	17	24	16	29	19	15	23	16	30	38				

栽培面積：薩摩 1,465ha, 大隅 1,795ha, 熊毛 670ha … 計 3,930ha (令和5年産実績)

平年は2014～2023の平均値。

注1) 「概評」は、本年の発生ほ場率を過去10年間の平均値(平年値)から統計的に評価したものである。

注2) 「総合概評」は、上記「概評」に発生程度を加味して評価したものである。

※ 巡回調査地点名及び調査ほ場数

薩摩：南九州市顛娃町御領(2), 指宿市開聞仙田(2), 南さつま市加世田益山(2)・大浦町千拓(2)・金峰町田布施(2), 日置市日吉町吉利(2)・吹上町上田尻(2)・・・調査ほ場数：14ほ場

大隅：志布志市有明町野井倉(2), 大崎町横瀬(2), 鹿屋市串良町有里(2)・吾平町上名(2), 東串良町川東(2), 肝付町後田(2), 錦江町田代川原(2)・・・調査ほ場数：12ほ場

熊毛：中種子町熊野(2), 南種子町平山(2)・・・調査ほ場数：4ほ場

県計・・・巡回調査地点数：16地点(うち病害虫防除員調査分：熊毛2地点), 調査ほ場数：32ほ場