

作物名	病害虫名	総合 概評	概評	地域	発生 面積 (ha)	発生ほ場率 (%)			発生程度 (%)					年次別発生ほ場率 (%)										発病・発生数 (%, 頭, 枚)					備 考	
						本年	前年	平年	甚	多	中	少	無	'15	'16	'17	'18	'19	'20	'21	'22	'23	'24			本年	前年	評価		平年
サトウキビ	カンシヤコバナ ナガカメムシ (被害痕数)	やや少	やや少	奄美	3,686	46	84	58				46	54	30	36	56	56	64	71	68	60	52	84	5葉当り 吸汁痕数	奄美	0.3	1.1	少	(1.4)	
		やや少	やや少	熊毛	0	0	40	26					100	80	80	60	0	0	0	0	0	0	40	5葉当り 吸汁痕数	熊毛	0.0	0.8	やや少	(0.6)	
サトウキビ	カンシヤコバナ ナガカメムシ (成幼虫数)	少	少	奄美	3,045	38	94	76		2		36	62	98	78	54	62	64	69	88	66	92	94	5葉梢 当り 成幼虫数	奄美	0.7	3.1	少	(2.8)	
		並	並	熊毛	1,477	60	60	62				60	40	100	100	100	20	40	40	80	40	40	60	5葉梢 当り 成幼虫数	熊毛	0.2	5.3	やや少	(2.0)	
サトウキビ	カンシヤ クシコメツキ	やや少	やや少	奄美	0	0	2	1					100	0	0	0	6	2	0	0	2	2	2	50株当り 不萌芽茎 率	奄美	0.0	0.0	やや少	(0.0)	
		並	並	熊毛	0	0	0	0					100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50株当り 不萌芽茎 率	熊毛	0.0	0.0	並	(0.0)	
サトウキビ	メイチュウ類	少	少	奄美	3,740	47	71	64			3	44	53	53	60	57	57	64	75	80	59	61	71	20株当り 被害茎率	奄美	1.0	2.8	少	(2.3)	
		多	多	熊毛	985	40	20	16				40	60	30	30	30	0	0	0	10	10	30	20	20株当り 被害茎率	熊毛	1.2	0.2	多	(0.1)	
サトウキビ	ツマジロクサヨトウ	－	－	奄美	0	0	3	3					100									2	3	20株当り 新葉部 被害率	奄美	0.0	0.2	－	－	
		－	－	熊毛	0	0	0	0					100									0	0	20株当り 新葉部 被害率	熊毛	0.0	0.0	－	－	

※その他特記事項

【サトウキビ】
R7.4.14～18調査

●調査地点

サトウキビ 8,014ha（夏植え:821ha, 春植え:1,111ha, 株出し:5,254ha, 新植夏植え:828ha） 50ほ場調査【奄美大島30, 喜界島5, 徳之島5, 沖永良部5, 与論島5】
但し、メイチュウ類については防除員による調査ほ場は各島10ほ場の計75ほ場 ツマジロクサヨトウについては防除員の調査は奄美大島, 沖永良部島, 与論島は各5ほ場, 喜界島, 徳之島は各10ほ場の計60ほ場

※ 栽培面積 サトウキビ:「令和5年産さとうきび及び甘しや糖生産実績」（令和6年9月 県農産園芸課）から出典

※表中の「総合概評」は, 「発生面積評価」に「発病・発生数（率）」の発生程度を加味したものである。