早期水稻病害虫発生予察巡回調査月報（6月）

(No.1) 調査年月日：2025年 6月 12～19日

生育 状況	穂孕期～一部出穂期
----------	-----------

病害虫名	総合 概評	概評	地 域	発生面積 (ha)	発生面積率 (%)		程度別発生面積率 (%)															記 事	
					本年	平年	甚	多	中	少	無	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
〇いもち病	やや少	やや少	南 薩	0	0	25					100	21	64	7	29	0	0	21	71	21	17	調査外のほ場（南薩）で6月2日にいもち病の初発を確認した（技術情報第6号）	
			大 隅	0	0	19					100	14	21	0	0	14	21	36	50	29	0		
			熊 毛	0	0	8					100	0	0	0	0	0	0	0	50	0	25		
			県 計	0	0	19					100	14	32	2	10	6	10	24	58	21	10		
紋枯病	やや少	やや少	南 薩	0	0	0					100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			大 隅	0	0	1					100	7	0	0	0	0	0	0	7	0	0		
			熊 毛	0	0	5					100	0	0	0	0	0	0	0	25	0	25		
			県 計	0	0	2					100	3	0	0	0	0	0	0	8	0	4		
ばか苗病	やや多	多	南 薩	0	0	1					100	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	少:有明2	
			大 隅	247	14	1				14	86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14		
			熊 毛	0	0	0					100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			県 計	247	6	1				6	94	2	0	0	0	0	0	0	0	0	7		
ごま葉枯病	やや少	やや少	南 薩	0	0	2					100	0	0	7	0	0	0	0	0	0	8		
			大 隅	0	0	0					100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			熊 毛	0	0	0					100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			県 計	0	0	1					100	0	0	2	0	0	0	0	0	0	3		

栽培面積： 薩摩 1,480 ha 大隅 1,730 ha 熊毛 650 ha 平年は2015～2024の平均値。

注1) 「概評」は、本年の発生ほ場率を過去10年間の平均値(平年値)から統計的に評価したものである。

注2) 「総合概評」は、上記「概評」に発生程度を加味して評価したものである。

※ 巡回調査地点名及び調査ほ場数

薩 摩： 南九州市顛娃町御領 (2) , 南さつま市加世田益山 (2) ・大浦町干拓 (2) ・金峰町田布施 (2) , 日置市日吉町吉利 (2) ・吹上町上田尻 (2) ・ ・ 調査ほ場数：12ほ場

大 隅： 志布志市有明町野井倉 (2) , 大崎町横瀬 (2) , 鹿屋市串良町有里 (2) ・吾平町上名 (2) , 東串良町川東 (2) , 肝付町後田 (2) , 錦江町田代川原 (2) ・ ・ ・ 調査ほ場数：14ほ場

熊 毛： 中種子町 熊野 (2) , 南種子町 平山 (2) ・ ・ ・ 調査ほ場数：4ほ場

県 計： ・ ・ ・巡回調査地点数：15地点 (うち病害虫防除員調査分:熊毛2地点) , 調査ほ場数：30ほ場

早期水稻病害虫発生予察巡回調査月報（6月）

(No. 2) 調査年月日：2025年 6月 12 ~ 19日

生育状況 穂孕期 ~ 一部出穂期

病害虫名	総合概評	概評	地域	発生面積 (ha)	発生面積率 (%)		程度別発生面積率 (%)															記事	
					本年	平年	甚	多	中	少	無	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
ツマクノヨコバエ	並	並	南薩	863	58	52				58	42	36	64	57	64	57	57	36	36	57	58	少:大浦1, 穎娃1, 金峰1 加世田1, 吹上1, 日吉2, 田代2, 吾平1, 串良1, 高山2.	
			大隅	865	50	51				50	50	71	71	93	50	0	50	14	71	36	50		
			熊毛	0	0	0						100	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
			県計	1,728	45	42				45	55	46	55	63	46	23	43	19	46	38	45		
ヒメヒゲウカ	並	多	南薩	1,480	100	26			8	92	50	29	14	29	21	21	0	14	36	42	少:開聞1, 加世田1, 吹上1, 日吉2, 有明2		
			大隅	741	43	23				43	57	21	21	36	43	0	29	21	36	7		14	
			熊毛	0	0	0					100	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
			県計	2,221	58	20			3	54	42	27	20	22	30	9	21	10	22	17		22	
セシウカ	やや多	やや多	南薩	1,480	100	87				100	100	86	57	86	86	79	86	71	117	少:吹上2, 大浦2, 穎娃2, 金峰2, 加世田2, 日吉2, 田代1, 吾平2, 串良2, 高山2, 東串良1, 大崎1, 有明1			
			大隅	1,236	71	74				71	29	93	93	71	57	7	86	100	93		50	86	
			熊毛	0	0	0					100	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	
			県計	2,716	70	65				70	30	77	78	63	46	37	70	74	73		49	83	
ヒゲウカ	並	並	南薩	0	0	3				100	0	0	14	0	0	0	0	14	0	0			
			大隅	0	0	0					100	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			熊毛	0	0	0					100	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			県計	0	0	1					100	0	0	5	0	0	0	5	0	0			
コブメカ	やや少	やや少	大隅	0	0	14				100	21	14	29	29	7	21	14	0	0	0			
			熊毛	0	0	0					100	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			県計	0	0	10					100	17	14	18	16	6	12	7	0	8			
			南薩	0	0	0					100	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
フナヒコカ	並	並	大隅	0	0	2				100	7	14	0	0	0	0	0	0	0	0			
			熊毛	0	0	0					100	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			県計	0	0	1					100	3	7	0	0	0	0	0	0	0			
			南薩	123	8	25				8	92	36	29	14	43	57	57	7	7	0		0	
イモジセリ	少	少	大隅	0	0	31				100	43	64	43	79	14	21	14	0	21	7	少:吹上1		
			熊毛	0	0	0					100	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			県計	123	3	23				3	97	32	40	25	51	29	30	9	3	10		3	
			南薩	0	0	9					100				7	0	0	14	14	21		8	
イカカムシ			大隅	0	0	4				100				0	0	0	0	14	7	7			
			熊毛	0	0	0					100				0	0	0	0	0	0			
			県計	0	0	5					100				3	0	0	5	12	11		6	

栽培面積： 薩摩 1,480 ha 大隅 1,730 ha 熊毛 650 ha 平年は2015~2024の平均値。

その他病害虫：

※ 巡回調査地点名及び調査ほ場数

薩摩： 南九州市穎娃町御領（2）、南さつま市加世田益山（2）・大浦町干拓（2）・金峰町田布施（2）、日置市日吉町吉利（2）・吹上町上田尻（2）・・・調査ほ場数：12ほ場

大隅： 志布志市有明町野井倉（2）、大崎町横瀬（2）、鹿屋市串良町有里（2）・吾平町上名（2）、東串良町川東（2）、肝付町後田（2）、錦江町田代川原（2）・・・調査ほ場数：14ほ場

熊毛： 中種子町 熊野（2）、南種子町 平山（2）・・・調査ほ場数：4ほ場

県計・・・巡回調査地点数：15地点（うち病害虫防除員調査分:熊毛2地点）、調査ほ場数：30ほ場