

各関係機関の長 殿

鹿児島県病害虫防除所長

平成21年度 技術情報第10号（普通期水稻のいもち病）について（送付）

いもち病の今後の防除対策について、下記のとおりとりまとめましたので送付します。

平成21年度 技術情報第10号

- 1 対象病害虫 いもち病
- 2 対象作物 普通期水稻
- 3 発生状況

- (1) 7月15～23日の巡回調査での発生ほ場率24%（平年29%）は平年並みであった。
- (2) 7月31日～8月5日の調査では発生ほ場率が65%（平年48%）で，とくに北薩平坦および大隅地域では100%と高く（表1），発生程度の高いほ場も認められた。

4 防除上注意すべき事項

- (1) いもち病の上位葉への発生が認められる場合は，粉剤または液剤で早急に防除を行う。
- (2) いもち病の常発地や葉色が濃いほ場では，穂肥の施用は控える。
- (3) 粉剤または液剤による穂いもち防除は，穂ばらみ期と穂揃期の2回行う。
- (4) 農薬の使用基準を遵守し，薬剤散布にあたっては飛散に十分注意して行う。

(参考資料)

表1 葉いもち病の発生状況 調査日：7月31日～8月5日

地域名	発生ほ場率 (%)		調査ほ場数
	平成21年	平年	
南 薩	10	43	10
北薩平坦	42	40	24
北薩山間	100	61	22
大 隅	100	49	6
県 計	65	48	62

※ 平年値は1999年～2008年までの平均

※ 巡回調査地点

南 薩：南九州市知覧町永里・川辺町古殿・川辺町勝目
日置市伊集院町大田，いちき串木野市大里北薩平坦：鹿児島市東佐多町，蒲生町楠田，始良町三拾町
霧島市隼人町住吉・国分上小川，薩摩川内市宮崎・高江
出水市野田町屋地・高尾野町東干拓，出水市六月田
薩摩川内市入来町浦之名，阿久根市鶴川内北薩山間：さつま町宮之城平川・宮之城時吉・鶴田大角・中津川，薩摩川内市祁答院町上手
伊佐市菱刈前目・田中，伊佐市大口金波田・大田・山野，湧水町北方

大 隅：曾於市末吉町高松・大隅町笠木，鹿屋市野里