

北薩感染症情報

2021年第39週(9月27日~10月3日)

【問い合わせ先】〒895-0041 薩摩川内市隈之城町228番地1

北薩地域振興局保健福祉環境部(川薩保健所)健康企画課

電話 0996-23-3165 FAX 0996-20-2127

E-メール kita-kenkou-shippei@pref.kagoshima.lg.jp

川薩・出水保健所における定点報告疾患

◎: 警報発令中 ○: 注意報発令中

定点種別	対象疾患	警報レベル			注意報レベル	川薩保健所管内					出水保健所管内				
		開始基準値	終息基準値	基準値		前週報告数(人)	今週報告数(人)	定点報告数	前週からの増減	警報注意報	前週報告数(人)	今週報告数(人)	定点報告数	前週からの増減	警報注意報
内科・小児科 定点	インフルエンザ	30.0	10.0	10.0		-	-	-	→	-	-	-	-	→	-
小児科 定点	RS	-	-	-		1	4	1.00	↗	-	1	-	-	↓	-
	咽頭結膜熱	3.0	1.0	-		1	-	-	↓	-	-	1	0.33	↗	-
	A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎	8.0	4.0	-		1	1	0.25	→	-	2	3	1.00	↗	-
	感染性胃腸炎	20.0	12.0	-		6	5	1.25	↓	-	-	-	-	→	-
	水痘	2.0	1.0	1.0		1	-	-	↓	-	1	-	-	↗	-
	手足口病	5.0	2.0	-		3	6	1.50	↗	-	14	14	4.67	→	◎
	伝染性紅斑	2.0	1.0	-		-	-	-	→	-	-	-	-	→	-
	突発性発疹	-	-	-		2	1	0.25	↓	-	1	1	0.33	→	-
	ヘルパンギーナ	6.0	2.0	-		1	2	0.50	↗	-	1	2	0.67	↗	-
	流行性耳下腺炎	6.0	2.0	3.0		2	-	-	↓	-	-	-	-	→	-
眼科 定点	急性出血性結膜炎	1.0	0.1	-		-	-	-	→	-	/	/	/	/	/
	流行性角結膜炎	8.0	4.0	-		2	-	-	↓	-	/	/	/	/	/
基幹 定点	細菌性髄膜炎	-	-	-		-	-	-	→	-	-	-	-	→	-
	無菌性髄膜炎	-	-	-		-	-	-	→	-	-	-	-	→	-
	マイコプラズマ肺炎	-	-	-		-	-	-	→	-	-	-	-	→	-
	クラミジア肺炎	-	-	-		-	-	-	→	-	-	-	-	→	-
	感染性胃腸炎 病原体がロタウイルスに限る	-	-	-		-	-	-	→	-	-	-	-	→	-
インフルエンザ 入院報告	-	-	-		-	-	-	→	-	-	-	-	→	-	
報告数合計		-	-	-		20	19	-	↓	/	20	21	-	↗	/

<注意報・警報>

- ・川薩保健所管内 なし
- ・出水保健所管内 手足口病(警報)

<全数報告>


- ・川薩保健所管内 結核1例
- ・出水保健所管内 結核1例

<インフルエンザ様疾患による学級閉鎖等>

- ・川薩保健所管内 なし
- ・出水保健所管内 なし

定点種別	疾病	警報/終息 基準値	注意報 基準値	川薩保健所管内推移 (定点報告数) 基幹定点(報告数掲載)									
				30週	31週	32週	33週	34週	35週	36週	37週	38週	39週
内科・小児科 定点	インフルエンザ	30.00/10.00	10.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
小児科定点	RSウイルス感染症	-	-	2.00	3.75	1.00	0.25	-	-	0.50	0.25	0.25	1.00
	咽頭結膜熱	3.00/1.00	-	1.50	0.75	0.50	0.75	1.50	0.25	0.25	0.25	0.25	-
	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	8.00/4.00	-	1.50	0.50	0.25	-	0.50	0.25	-	0.25	0.25	0.25
	感染性胃腸炎	20.00/12.00	-	1.50	0.75	2.00	0.75	0.25	1.25	2.00	2.00	1.50	1.25
	水痘	2.00/1.00	1.00	-	0.50	0.25	0.25	0.25	-	-	0.25	0.25	-
	手足口病	5.00/2.00	-	-	-	-	0.25	0.50	-	1.25	2.00	0.75	1.50
	伝染性紅斑	2.00/1.00	-	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	突発性発疹	-	-	1.25	0.25	-	0.50	0.25	-	0.25	0.75	0.50	0.25
	ヘルパンギーナ	6.00/2.00	-	-	-	-	-	-	0.25	0.25	-	0.25	0.50
流行性耳下腺炎	6.00/2.00	3.00	-	-	0.25	-	-	0.25	0.25	-	0.50	-	
眼科定点	急性出血性結膜炎	1.00/0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	流行性角結膜炎	8.00/4.00	-	2.00	2.00	1.00	1.00	-	2.00	3.00	2.00	2.00	-
基幹定点	細菌性髄膜炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	無菌性髄膜炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	マイコプラズマ肺炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	クラミジア肺炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	感染性胃腸炎 病原体がロタウイルスに限る	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

定点種別	疾病	警報/終息 基準値	注意報 基準値	出水保健所管内推移 (定点報告数) 基幹定点(報告数掲載)									
				30週	31週	32週	33週	34週	35週	36週	37週	38週	39週
内科・小児科 定点	インフルエンザ	30.00/10.00	10.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
小児科定点	RSウイルス感染症	-	-	-	-	-	-	0.33	3.67	3.67	1.33	0.33	-
	咽頭結膜熱	3.00/1.00	-	1.33	1.00	2.33	1.00	1.00	0.33	-	-	-	0.33
	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	8.00/4.00	-	0.67	1.67	1.67	2.33	1.33	1.00	0.33	1.00	0.67	1.00
	感染性胃腸炎	20.00/12.00	-	0.33	0.67	0.33	-	0.33	-	-	0.33	-	-
	水痘	2.00/1.00	1.00	0.33	-	-	-	-	-	0.33	-	0.33	-
	手足口病	5.00/2.00	-	0.33	4.67	7.33	5.33	7.67	3.33	2.33	4.00	4.67	4.67
	伝染性紅斑	2.00/1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	突発性発疹	-	-	0.33	-	0.33	-	-	0.33	-	0.67	0.33	0.33
	ヘルパンギーナ	6.00/2.00	-	-	-	-	-	-	-	0.33	2.00	0.33	0.67
流行性耳下腺炎	6.00/2.00	3.00	-	-	-	-	-	-	0.33	0.33	-	-	
基幹定点	細菌性髄膜炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	無菌性髄膜炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	マイコプラズマ肺炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	クラミジア肺炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	感染性胃腸炎 病原体がロタウイルスに限る	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



(警報・注意報)

第39週の手足口病の発生状況は、川薩保健所管内は、6名(定点報告あたり1.50)でした。

出水保健所管内からは、14名(定点報告あたり4.67)の報告がありました。

**※出水保健所管内に流行発生警報を
発令します。(8週連続)**

<手足口病の予防について>

- ・手足口病とは・・・乳幼児・小児を中心とした疾患で、口腔粘膜及び手や足などに現れる水疱性の発疹を主症状とした急性ウイルス感染症です。
夏期に流行のピークがありますが、秋から冬にかけても多少の発生が見られます。
- ・症状・・・3～5日の潜伏期において口腔粘膜、手掌、足底や足背などに水疱性の発疹が出現します。一般的には、発熱で始まる軽い病気で、ほとんどの人が、1週間から10日程度で自然に治ります。合併症もほとんどありませんが、まれに髄膜炎等の中樞神経症状が発生する事があります。
- ・感染経路・・・飛沫感染・便中に排泄されたウイルスによる経口感染、水疱内容物からの感染などがあります。
- ・予防方法・・・予防方法としては患者に近づかない、手洗いの励行など。
ウイルスは患者が回復しても2～4週間程度、糞便中に排泄されますので、排便後の手洗いの徹底が必要です。

<10月は臓器移植普及推進月間です>

毎年10月は「臓器移植普及推進月間」として、広く全国において、臓器移植への理解が進むように普及啓発の取り組みを行っています。

臓器移植法が施行された10月16日は、家族や大切な人と「移植」のこと、「いのち」のことを話し合い、お互いの臓器提供に関する意思を確認する日「グリーンリボンデー」としています。



臓器移植を待っている方はどのくらい？

日本臓器移植ネットワークに登録して待機している人は約1万4千人います。(2019年8月31日時点)

そのうち年間で移植を受けられる人は全体の約2パーセントにとどまります。

意思表示の方法はどうやって？

臓器提供についての意思表示には、下記の5つの方法があります。

いずれかの方法で書面による意思表示をしておくことが大切です。

1. 健康保険証 (記入は任意)
2. 運転免許証 (記入は任意)
3. マイナンバーカード (記入は任意)
4. 意思表示カード
5. インターネットでの意思登録



パソコンや携帯電話から日本臓器移植ネットワークのホームページ・モバイルサイトにアクセスし、臓器提供に関する意思を登録できます。インターネットで登録をすると、ID入りの登録カードが発行(自宅へ郵送)されます。

臓器提供時には検索が行われ、本人の意思をより確実に確認することができます。

「臓器を提供する」という意思だけではなく、「臓器を提供しない」という意思も表示できるようになっており、どちらの意思も尊重されます。

また提供したくない臓器があれば、その意思を表示することもできます。

もしものとき、誰かの命を救うことができるかもしれないし、助けてもらうかもしれない。わたしたち一人ひとりが、今、臓器提供について考え、家族と話し合い、自分の臓器提供に関する意思を表示しておくことが大切です。

臓器提供の意思について家族と話し合ったことがある方は約3割にとどまっています。

この期間に家族や大切な方と、話してみませんか？

参考ホームページ

グリーンリボンキャンペーンホームページ

<https://www.green-ribbon.jp/>

※ 新型コロナウイルスの参考資料（厚生労働省ホームページ）

○ 新型コロナウイルスに関する情報

【新型コロナウイルス感染症診療の手引き第4，2版】[令和3年2月19日更新](http://www.hospital.or.jp/pdf/20_20201204_01.pdf)
http://www.hospital.or.jp/pdf/20_20201204_01.pdf

【新型コロナウイルス感染症（COVID-19）病原体検査の指針第3.1版】[2021年3月3日更新](https://www.mhlw.go.jp/content/000678571.pdf)
<https://www.mhlw.go.jp/content/000678571.pdf>

高齢者施設でのクラスター発生 絶対阻止！

POINT！

三つの「黙」

① 食事の時は距離を保って黙って食べる
(会話は食事後，マスクを着けて)

黙食

② 職員は休憩，更衣時でもマスク着用，喫煙所では話さない(徹底してください)

黙煙

③ 脱衣所では距離を保って黙って入浴
(職員は目の保護とマスクの着用)

黙浴

監修：川村 英樹
鹿児島大学病院感染制御部副部長

高齢者施設でのクラスター発生 絶対阻止！ (3ない運動)

監修：川村 英樹
鹿児島大学病院感染制御部副部長

持ち込まない

利用者

- 通所サービスは、体調が悪い時は利用を控えよう
- 家族の体調や、県外との往来にも気をつけよう

持ち込ませない

施設

- 体調の悪い職員は必ず休ませよう
- 体調の悪い入所者・職員は、早めに医師に相談を
- 面会はリモートで
- 感染リスクが高まる「5つの場面」を避けよう

【感染リスクが高まる5つの場面】

- ① 飲食を伴う懇親会等
- ② 大人数や長時間におよぶ飲食
- ③ マスクなしでの会話
- ④ 狭い空間での共同生活
- ⑤ 居場所の切り替わり

拡げない

施設

- 食事の時は、距離を保って、黙って食べよう
- 職員は休憩、更衣時でもマスク着用、喫煙スペースでも会話を控えよう
- 脱衣所では、距離を保って話さない、入浴介助も会話を控えよう
- 職員はマスク着用を徹底しよう（利用者さんにも協力を）

感染リスクが高まる「5つの場面」

場面① 飲酒を伴う懇親会等

- 飲酒の影響で気分が高揚すると同時に注意力が低下する。また、聴覚が鈍麻し、大きな声になりやすい。
- 特に居酒屋などで区切られている狭い空間に、長時間、大人数が滞在すると、感染リスクが高まる。
- また、同じ飲みや箸などの共用が感染のリスクを高める。



場面② 大人数や長時間におよぶ飲食

- 長時間におよぶ飲食、接待を伴う飲食、深夜のはしご酒では、短時間の食事と比べて、感染リスクが高まる。
- 大人数、例えば5人以上の飲食では、大声になり飛沫が飛びやすくなるため、感染リスクが高まる。



場面③ マスクなしでの会話

- マスクなしに近距離で会話することで、飛沫感染やマイクロ飛沫感染での感染リスクが高まる。
- マスクなしでの感染例としては、昼カラオケなどでの事例が確認されている。
- 車やバスで移動する際の車中でも注意が必要。



場面④ 狭い空間での共同生活

- 狭い空間での共同生活は、長時間にわたり閉鎖空間が共有されるため、感染リスクが高まる。
- 赤の部屋やトイレなどの共用部分での感染が疑われる事例が報告されている。



場面⑤ 居場所の切り替わり

- 仕事中の休憩時間に入った時など、居場所が切り替わると、気の配みや環境の急変により、感染リスクが高まることもある。
- 休憩室、喫煙所、更衣室での感染が疑われる事例が確認されている。

